

## Behandling

Tablet Vermox, 3 gange med 2 ugers interval.  
Hele familien behandles.

## Smitte

Børneorm er meget smitsomt. Det smitter ved, at man får æg fra børneormen under neglene, som vi så afsætter på håndklæder, i sengetøjet, på bamserne og hinanden, på maden og i munden.

## Hygiejne

Det er vigtigt, at holde følgende hygiejne regler under de 6 ugers behandling:

- Vask alt sengetøj og håndklæder ved 60 grader hver gang I får en Vermox tablet.
- Sovedyrerne skal have samme tur, eller i fryseren i flere dage.
- Klip neglene.
- Skrub neglene grundigt med neglebørste på alle i familien.

Børnelægeklinikken Horsens



Vejledning om børneorm

## Børneorm

Forekommer hyppigt blandt børn i 5 - 10 års alderen. Flere personer i husstanden/institutionen er ofte smittet.

### Symptomer

- Mavesmerter
- Numsekløe
- Søvnbesvær, rastløshed og irritabilitet.



Børneorm er en lille gulhvid orm, som er 8 - 13 mm x 0,5 mm. Den bor i tarmen og lægger æg ved numsehullet, når vi sover, og derfor klør det.

### Diagnosen stilles ved analskrab for børneorm

Du skal bruge

- Tungespatel
- Klar tape
- 3 objektglas
- Laboratorieseddel
- Transporttæske
- Indpakningspap
- Foret konvolut med adresse til mikrobiologerne



Chancen for "fangst" er størst, hvis prøven tages om morgenen før bad.

Vi vil gerne have 3 prøver, idet man ved en enkelt prøve kun påviser æg i ca. 50 % af tilfældene, mens man ved tre prøver øger fangsten til 90 %.

### Sådan gør du:

- Sæt tapen fast om tungespatelen med klisteret udad.



- Gå ind til barnet og tag numseprøven, før han/hun står ud af sengen.
- Bed barnet om at presse lidt, så numsen åbner sig en smule.
- Hold tungespatlen fast mod numsehullet og pres ballerne sammen omkring tapen.
- Træk tapen væk igen
- Sæt tapen fast på objektglasset ned klisteret nedad.
- Sæt en strekkode på objektglasset, som vist på billedet
- Indsæt glasset i den lille transporttæske.
- Gentag proceduren næste dag
- Når du har tre prøver sendes de med posten til mikrobiologerne

**Bare rolig, vi viser dig hvordan og tager den første prøve i klinikken**